

Lycée oued Eddahab	Devoir surveillé 1 de physique chimie	Durée : 2h G A
Niveau : 1 er Bac B.I.O.F		Prof : N.B.T
Nom :	Prénom :	N° :

Exercice 1 : (7points)

On donne :

$$M(S) = 32 \text{ g.mol}^{-1}, \quad M(O) = 16 \text{ g.mol}^{-1}, \quad M(C) = 12 \text{ g.mol}^{-1}, \quad M(H) = 1 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{La constant d'Avogadro : } N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$$\text{La masse volumique de l'eau } \rho_e = 1 \text{ g.mL}^{-1}$$

$$\text{La constante des gaz parfait : } R = 8,31 \text{ Pa.m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

- 1)- Définir le volume molaire et la loi de Boyle-Mariotte. (1pt)
- 2)- La masse d'un échantillon de soufre S est $m = 8 \text{ g}$.
 - 2.1)- Calculer la quantité de matière qui se trouve dans cette échantillon. (1pt)
 - 2.2)- Déterminer le nombre d'atome qui se trouve dans cette masse. (1pt)
- 3)- L'éthanol pur est un liquide sa densité par rapport à l'eau $d = 0,79$ et sa formule C_2H_5OH .
 - 3.1)- Calculer la quantité de matière de l'éthanol qui se trouve dans le volume $V = 100 \text{ mL}$ de ce liquide. (1pt)
 - 3.2)- déduire la masse de cette échantillon de l'éthanol. (1 pt)
- 4)- Un cylindre, de volume $V = 2 \text{ m}^3$, contient un gaz de dioxyde de carbone CO_2 à la température $\theta = 20^\circ C$ et sous une pression de $P_1 = 1013 \text{ hPa}$. A température constante, on ajoute une quantité de gaz de dioxygène O_2 et la pression du mélange des gaz devient $P_2 = 1040 \text{ hPa}$.
 - 4.1)- Calculer n_1 la quantité de matière de CO_2 qui se trouve dans le cylindre. (1 pt)
 - 4.2)- Calculer la masse m du mélange gazeux qui se trouve dans le cylindre. (1 pt)

Exercice 2 (7 points):

Le tambour d'une machine à laver le linge est un cylindre de 46 cm de diamètre. Au moment de l'essorage, il tourne autour de son axe à 800 tr/min .

- 1- Déterminer la nature du mouvement de tambour. Justifier votre réponse. (1pt)
- 2- Déterminer la valeur de la vitesse angulaire ω dans système international. (1pt)
- 3- Définir puis calculer la période T de rotation du cylindre, déduire sa fréquence f . (1,5pt)

4- Ecrire la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Calculer la valeur de l'abscisse curviligne d'un point situé sur la circonférence du cylindre quand il effectue 2 tours complets. (1,5 pt)

5- Une goutte d'eau s'échappe du contour du cylindre de la machine à laver pendant le mouvement.


5.1)- Calculer la vitesse linéaire de la goutte d'eau au moment de son échappement du cylindre. (1pt)

5.2)- Représenter sur un schéma le vecteur vitesse linéaire de la goutte en utilisant une échelle convenable. (1pt)

Exercice 3 : (7 points)

Un corps solide (S) de masse $m = 2kg$ se déplace sur une trajectoire ABC tel que $AB = 100cm$ et $BC = 1,5m$ et $\alpha = 30^\circ$ (voir figure)

O, donne : $g = 10 N.kg^{-1}$



1- Faire l'inventaire des forces agissant sur le solide (S) pendant son déplacement de A à B. (0,5pt)

2- Calculer le travail du poids pendant le déplacement AB. (1pt)

3- sachant que la somme des travaux effectués sur le corps (S) entre A et B est $\sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = 10 J$

3.1)- Calculer le travail de la force \vec{R} exercée par le plan incliné. (1pt)

3.2)- Qu'est-ce que vous concluez ? (0,5pt)

4- Le solide (S) poursuit son mouvement sur le plan horizontal BC, avec frottements. On considère que la direction de la force de frottement est parallèle à la trajectoire et son travail est

$$W_{B \rightarrow C}(\vec{f}) = -15 J .$$

4.1)- Calculer l'intensité de la force \vec{f} . (1pt)

4.2)- Représenter sur le schéma toutes les forces qui s'exercent sur le solide (S) avec l'échelle $1cm \rightarrow 10 N$ (1pt)

On donne $P = R_N$ (R_N : est la composante normale de la force \vec{R} et P : est le poids du corps (S)).

4.3)- Calculer l'intensité de la force \vec{R} appliquée par le plan horizontale BC sur le corps (S). (1pt)

Fin du sujet A